

Saint-Paul, le 01/02/2022

Mr. Gilles **DE RIBAS**
Né(e) le 01/06/1968

Docteur SALZA

IRM DU GENOU GAUCHE

INDICATION :

- Hydarthrose à l'effort. Recherche de lésion chondrale.

TECHNIQUE :

- 3 plans DP FS, coupes sagittales T1.

RÉSULTAT :

Compartiment médial :

- Pas d'anomalie de forme, de position ou du signal du ménisque.
- Irrégularité et hétérogénéité du revêtement cartilagineux.
- Absence d'anomalie du ligament latéral interne. Intégrité des tendons de la patte d'oie.

Compartiment latéral :

- Pas d'anomalie de forme, de position ou du signal du ménisque.
- Petit remaniement kystique mucoïde au versant postérieur du ménisque.
- Irrégularité du revêtement cartilagineux, diminué d'épaisseur de moins de 50%.
- Pas d'anomalie du LLE.
- Absence d'anomalie de l'insertion distale de la bandelette ilio-tibiale, du biceps fémoral.

Compartiment antérieur :

- Ulcération intéressant toute l'épaisseur du cartilage au niveau de la trochlée latérale étendue sur 13 mm. Irrégularité du cartilage patellaire.
- Epanchement intra-articulaire de faible à moyenne abondance.
- Intégrité du système extenseur.

Pivot central :

- Intégrité des ligaments croisés.

Creux poplité :

- Kyste poplité étendu sur environ 5 cm, d'aspect fissuré avec infiltration liquidienne le long de l'aponévrose superficielle du gastrocnémien médial, et le long des tendons gracile et semi-tendineux.

CONCLUSION :

- **Chondropathie focale grade IV fémoropatellaire latérale sous forme d'une ulcération intéressant toute l'épaisseur cartilagineuse de la trochlée.**
- **Chondropathie débutante fémorotibiale médiale et latérale.**
- **Épanchement intra-articulaire de faible à moyenne abondance.**
- **Kyste poplité, fissuré avec infiltration liquidienne le long de l'aponévrose partielle du gastrocnémien médial, les tendons gracile semi-tendineux.**

Docteur MAILLOT Julie
Imagerie Médicale de Savannah

